

MOLUSQUICIDA



Cebo granulado

MATA BABOSAS Y CARACOLES

Cebo granulado

Composición

Metaldeído: 2, 4, 6, 8 - tetrametil - 1, 3, 5, 7 tetraoxaciclooctano.....	5 g
Inertes.....c.s.p.....	100 g

"LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO"
SENASA Nº 33.446

Producto NO INFLAMABLE CONTENIDO NETO: 25 kg
Origen: FRANCIA

Es un producto de:

RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Avda. Pte. Dr. Arturo Frondizi Nº 1150 - Calle Nº 1 - Parque Industrial
C.P. B2702HDA - Pergamino (Bs.As.) - Argentina
TE: +54 2477 409400 - FAX: +54 2477 432893
info@rizobacter.com.ar - www.rizobacter.com.ar
Fabricado por: **DE SANGOSSE - FRANCIA**

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

No humedecer el producto. No aplicar el producto en montones.
No ingerir, no beber, ni comer, ni fumar durante su utilización. Conservar el producto en su empaque original. No utilizar el aplicador Clartex con otros químicos o abonos. Conservar al abrigo del calor y de la humedad. Lavarse las manos luego de su aplicación. Clartex contiene un agente AMARGO repulsivo, el BITREX, que limita su ingestión accidental por parte de los animales domésticos (perros, gatos, etc).

RIESGOS AMBIENTALES: ABEJAS, ORGANISMOS ACUÁTICOS Y AVES

Por su recomendación de uso es un producto NO TÓXICO para ABEJAS. Producto LIGERAMENTE TÓXICO para PECES, evitar la contaminación de fuentes de agua. Producto MODERADAMENTE TÓXICO para AVES.

TRATAMIENTO DE REMANENTES:

Después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados incluyendo los equipos de seguridad utilizados. Los restos de producto no utilizado, se deberán distribuir sobre el campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Perfórelos para inutilizarlos completamente. Acópielos en un sector aislado, bien delimitado, cubierto, que ofrezca la máxima garantía para la salud humana y el ambiente y envíelos para su reciclado a lugares habilitados al efecto por las autoridades zonales.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco, fresco, bajo techo y a una temperatura entre 0° y 30°C.

DERRAMES:

En caso de derrames, barra, recoja con pala y entierre el barrido en un lugar donde no se contaminen fuentes de agua. Luego, si el piso es firme, lave con abundante agua el lugar.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión accidental, dar a beber abundante agua y no inducir al vómito. Por contacto en piel u ojos: enjuagar con abundante agua limpia. EN TODOS LOS CASOS PROCURAR ASISTENCIA MÉDICA DE INMEDIATO.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: MODERADAMENTE PELIGROSO: CLASE II

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Centro Toxicológico del Hospital Municipal de Niños de Bs. As.,
Dr. Ricardo Gutiérrez: tel. (011) 4962-2247/6666.
Hospital de Clínicas de Bs. As. Gral. SAN MARTIN: tel. (011) 5950-8804/6.
Centro Nacional de Intoxicaciones, Policlínico Posadas
(Haedo, Pcia. Bs. As.): tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777.
Centro de Consultas Toxicológicas - TAS. (Rosario): tel. (0341) 424-2727.

GENERALIDADES:

Este producto elimina los moluscos gasterópodos (babosas y caracoles). Tóxico por ingestión y contacto para las especies de los siguientes organismos nocivos:

Babosas: BABOSA GRIS (*Deroceras sp*) / BABOSA NEGRA (*Arion sp*) / babosa gris - BABOSA GRUESA AMARILLA (*Limax sp*) / MILAX (*Milax sp*) / TANDONIA (*Tandonia sp*);

Caracoles: *Theba pisana* - *Cernuella virgata* - *Cochlicella sp* - *Helix aspera* - *Pomacea sp* - *Achatina fulica* - *Bradybaena similaris* - *Cerithidae sp.* que puedan aparecer en cultivos agrícolas (girasol, maíz, trigo, colza, arroz, soja, tabaco, etc), horticultura, jardines, pastos y forrajes, árboles frutales, cítricos, legumbres, frutas, flores.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

DOSIS: 5 a 7 kg/ha

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: de acuerdo a la actividad de los organismos nocivos (babosas, caracoles, otro tipo de moluscos) y a los cambios climáticos.

RECOMENDACIONES DE USO:

TRATAMIENTO PREVENTIVO: 5 a 7 kg/ha; expandir, aplicar, arrojar sobre la superficie durante la siembra.

TRATAMIENTO CURATIVO: 5 a 7 kg/ha; expandir, arrojar, aplicar sobre la superficie en el momento de la aparición de babosas y caracoles.

RESTRICCIONES DE USO:

Por su recomendación de uso, no presenta período de carencia. "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD:

Por su especificidad, se recomienda su aplicación en forma individual.

FITOTOXICIDAD:

NO PRESENTA.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Nota: NO ESTANDO EL ALMACENAMIENTO NI SU APLICACIÓN BAJO EL CONTROL DE NUESTRA FIRMA, **RIZOBACTER ARGENTINA S.A.** NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS A PERSONAS, CULTIVOS O ANIMALES POR EL USO DISTINTO AL INDICADO EN ESTA ETIQUETA.

Producido por:



DE SANGOSSE

Bp5
47480 Pont Du Casse
S.A. au Capital de 3 040 815
Siret: 300 163 896 000 16
Tél: +33 (0) 5 53 69 36 30
Internet: www.desangosse.com
www.desangosse.com



NO CIVO

