

Procedimiento para inocular
100 kg de semillas de trigo con


Rizofos
FERTILIZANTE
BIOLÓGICO *liq*®



Colocar en el balde el contenido de un sachet de **Premax R** (200 mL).



Agregar el contenido de un sachet de **Rizofos Liq Maíz** (500 mL) y revolver hasta obtener una mezcla bien homogénea.



Aplicar la totalidad de la mezcla 700 mL a 100 kg de semilla de maíz o medir con la jarra graduada, su equivalente de 140 mL por bolsa (16-20 kg de semilla).

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

- Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
- Todo el procedimiento debe hacerse en lugares donde no incida directamente la radiación solar.
- En el caso de que la siembra se realice seguidamente del tratamiento de semilla y bajo condiciones de alta humedad ambiental, se recomienda realizar un oreado de la semilla tratada de al menos 30 minutos antes de colocarla en la sembradora.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

IMPORTANTE:

El soporte de este producto ha sido esterilizado previamente a la incorporación de las bacterias, suministrando exclusivamente a las semillas bacterias solubilizadoras de fósforo.

Avda. Pte. Dr. Arturo Frondizi Nº 1150
Calle Nº 1 - Parque Industrial
C.P. B2702HDA - Pergamino (Bs.As.) - Argentina
Tel: +54 2477 409400. FAX: +54 2477 432893
info@rizobacter.com.ar - www.rizobacter.com.ar



RIZOBACTER
ARGENTINA S.A.