

Rizopack



Inoculante
Rizo-Liq Pack

Curasemilla
Ritiram Carb

INSTRUCCIONES DE USO

Procedimiento para inocular 1.300 kg de semilla de soja con RizoPack® 101



1. Colocar el contenido de una vejiga de RIZO-LIQ PACK de 1,1 L en un bidón de RITIRAM CARB de 3,9 L previamente agitado y vuelva a agitar durante unos segundos.



2. Aplicar la totalidad de esta mezcla (5 L) a 1.300 kg de semilla, o su equivalente de 192 mL cada 50 kg.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
- Una vez preparada la mezcla -que contiene RITIRAM CARB-, se recomienda realizar la inoculación antes de transcurridas las 2 horas de su preparación.**
- Todo el procedimiento de inoculación debe hacerse en lugares donde no incida directamente la radiación solar.
- En el caso de que la siembra se realice seguidamente del tratamiento de semilla y bajo condiciones de alta humedad ambiental, se recomienda realizar un oreado de la semilla tratada de al menos 30 minutos antes de colocarla en la sembradora.
- Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Avda. Pte. Dr. Arturo Frondizi N° 1150 - Calle N° 1 - Parque Industrial
C.P. B2702HDA - Pergamino (Bs.As.) - Argentina
Tel.: 54-2477-409400. FAX: 54-2477-432893
info@rizobacter.com.ar - www.rizobacter.com.ar



RIZOBACTER
ARGENTINA S.A.